

**МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
Doctor Vera**

www.doctorvera.kiev.ua
info@doctorvera.kiev.ua

Адрес: 03110, Украина,
г. Киев, ул. И. Клименка, 10/17

Тел.: 249-91-34, 332-86-17, 332-85-13, 332-85-14

#110123

Фамилия :
Имя :
Отчество :
Год рождения : 1974

>

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ брюшной полости: 13.08.14 года _ ВГС впервые выявлен.

ПЕЧЕНЬ увеличена умеренно преимущественно за счет правой доли , левая доля 67 мм, правая доля 162 мм; контур четкий, ровный. Паренхима зерниста, не уплотнена, эхогенность в норме, угасание УЗ в норме. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены, единичные уплотнены диффузно по всей печени, включений нет.

ОБЩИЙ ПЕЧЕНОЧНЫЙ ПРОТОК не расширен 5 мм, прослеживается до головки pancreas, конкрементов нет .

Эластография печени:правая доля 4.9;5.6;5.7 кПа,левая 5.5;5.4;4.1 кПа.

V.portae(в воротах печени): без особенностей диаметр нормальный 12 мм, деформации нет . Кровоток гепатопетальный монофазный в норме 30.5 см/с., просвет проходим, включений нет.

V.lienal is в воротах селезенки: диаметр нормальный 7 мм, просвет проходим .Кровоток спленофтужальный.

©. ПЕЧЕНЬ: в VI сегменте печени в толще паренхимы визуализируется одно образование 23x 21 мм, округлой формы, контур неровный, нечеткий.

Структура неоднородная за счет анэхогенных участков с септами; без гипоэхогенного ободка; капсула толстая, эхогенная 5- 6 мм, с феноменом усиления УЗ .Редкие сосуды проходят транзитом, включений нет .Очаг оттесняет сосуды печени.

V.cava inf. на уровне печени: без особенностей диаметр нормальный 16 мм, деформации нет, просвет проходим .Печеночные вены не расширены.

Aorta в брюшном отделе без особенностей диаметр нормальный 15 мм, деформации нет, просвет проходим, включений нет . Парааортальные и паракровальные ЛУ не увеличены.

ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ, расположен типично, увеличен незначительно 71x 23мм грушевидной формы, содержит складку в воронке; стенки уплотнены, эхогенность повышенна, не утолщены. Визуализируется одна гиперэхоструктура в воронке на задней стенке, пристеночные, фиксированные, структура рыхлая 3x 3 мм, без УЗ тени и кровотока. Желчь слоистая, содержит единичные "хлопья".

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА визуализируется фрагментами из-за метеоризма не увеличена, головка 21мм, тело 12мм, хвост 25мм, обычной формы, контур ровный, четкий. Паренхима зернистая, с уплотнениями, мелкими редкими, эхогенность нормальная.

Главный панкреатический проток без особенностей.

Метеоризм, степень выражена.

Жидкость в полости брюшины не определяется.

СЕЛЕЗЕНКА не увеличена 112x 41 мм, полулуноной формы, контур четкий, ровный; паренхима однородна, не уплотнена, эхогенность нормальная; внутриселезеночные сосуды уплотнены единичные.

ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ:. Хр.гепатит, умеренно выраженная степень .F0 по эластографии. Крупноочаговое образование правой доли печени (вероятен абсцесс? Рек.МСКТ с контрастом).. Хр.холангит внутрипеченочных желчных протоков. Хр.бескаменный холецистит вне обострения. Холестероз желчного пузыря полипозно-сетчатая форма слабо выраженный значительно выраженный. Застой желчи, незначительная степень Эхоструктура поджелудочной железы в пределах возрастной нормы Эхоструктура селезенки в пределах возрастной нормы.

Документ : УЗИ - Брюшная полость+эла

Врач : Дынник О.Б.

Прибор : Ultima PA Expert