

| Исследование | Результат | Единицы | Референсные значения | Комментарий |
|----------------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| АлАТ | 15 | Ед/л | < 31 | |
| АсАТ | 17 | Ед/л | < 31 | |
| Билирубин общий | 13.7 | мкмоль/л | 5.0 - 21.0 | |
| Билирубин прямой | 4.9 | мкмоль/л | < 7.9 | |
| Креатинин | 63 | мкмоль/л | 53 - 97 | |
| Мочевина | 2.5 | ммоль/л | 2.5 - 6.4 | |
| Мочевая кислота | 220 | мкмоль/л | 150 - 350 | |
| Клинический анализ крови | . | | | |
| Гематокрит | 33.0 * | % | 35.0 - 45.0 | |
| Гемоглобин | 10.7 * | г/дл | 11.7 - 15.5 | |
| Эритроциты | 3.60 * | млн/мкл | 3.80 - 5.10 | |
| MCV (ср. объем эритроц.) | 91.7 | фл | 81.0 - 100.0 | |
| RDW (шир. распредел. эритроц.) | 15.7 * | % | 11.6 - 14.8 | |
| MCH (ср. содер. Hb в эр.) | 29.7 | пг | 27.0 - 34.0 | |
| MCHC (ср. конц. Hb в эр.) | 32.4 | г/дл | 32.0 - 36.0 | |
| Тромбоциты | 321 | тыс/мкл | 150 - 400 | |
| Лейкоциты | 3.13 * | тыс/мкл | 4.50 - 11.00 | |
| Палочкоядерные нейтроф. | 5 | % | 1 - 6 | |
| Нейтрофилы сегментояд. | 55 | % | 47 - 72 | |
| Нейтрофилы (общ. число) | 60 | % | 48.0 - 78.0 | |
| Лимфоциты | 28 | % | 19.0 - 37.0 | |
| Моноциты | 11 | % | 3.0 - 11.0 | |
| Эозинофилы | 1 | % | 1.0 - 5.0 | |
| Базофилы | 0 | % | < 1.0 | |
| СОЭ (по Вестергрену) | 40 * | мм/ч | < 20 | |