

Дата рождения 1977-10-13

Дата сдачи анализов 2012-04-02


Пол	М
Возраст	34

Альфа2 Макроглобулин	3.21 g/l
Гаптоглобин	0.07 g/l ⁽¹⁾⁽²⁾
Аполипопротеин А1	1.29 g/l
Билирубин	51 µmol/l ⁽²⁾
Гамма ГТ	202 IU/l
АЛТ	131 IU/l




FibroTest

FibroTest диагностирует фиброз печени



ActiTest

ActiTest диагностирует активность некровоспалительного процесса в печени (хронический гепатит В и С).



Предосторожности по использованию и интерпретации тестов

- Соблюдение рекомендуемых компанией BioPredictive условий до и во время проведения анализов является основой получения достоверных результатов.
- Тесты не применяются при остром гемолизе, остром гепатите, острых воспалительных заболеваниях, внепеченочном холестазе.
- Посоветуйтесь со специалистом при интерпретации теста в случае хронического гемолиза или синдрома Жильбера.
- Интерпретируемость тестов не была апробирована для пациентов с трансплантированной печенью.
- Будьте внимательны при интерпретации результатов в случае выхода за нормальные значения какого-либо из показателей.
- При расхождении результатов биопсии и теста посоветуйтесь со специалистом. Причиной могут быть невозможность интерпретации теста или ошибочные результаты биопсии: например, ошибка биопсии в определении стадии фиброза отмечается в 33% случаев.
- FibroTest проводится при хронических гепатитах В и С, алкогольном и неалкогольном стеатозе.
- ActiTest проводится при хронических гепатитах В и С.

(1) Это значение очень мало, ниже первого перценталя. Проверьте введенное значение, а также убедитесь в отсутствии гемолиза. Обычное минимальное значение составляет 0.08.
(2) Проверьте на наличие гемолиза, так как уровень билирубина очень высок, а гаптоглобина - низок.

